

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Bonn
(Direktor: Prof. Dr. P. Martini).

Tuberkuloseinfektion durch Milch.*)

INAUGURAL-DISSERTATION

zur

Erlangung der Doktorwürde

der

Hohen Medizinischen Fakultät

der

Rheinischen Friedrich Wilhelms-Universität zu Bonn



Vorgelegt am 7. Januar 1937.

von

Hans Surmann

aus Vilsendorf bei Bielefeld.

B O N N 1937

Anton Brand, Bonn

*) Mit Unterstützung des Westdeutschen Tuberkulose Forschungs-
institutes.

Gedruckt
mit Genehmigung der medizinischen Fakultät
der Universität Bonn.

Referent: Dozent Dr. Heymer.
Korreferent: Prof. Dr. Martini.



*Meinen Eltern
in Dankbarkeit gewidmet!*

Auf dem Tuberkulosekongreß in London im Jahre 1901 sprach Robert Koch auf Grund seiner Untersuchungen den Perlsuchtbazillen irgendwelche größere Bedeutung für die tuberkulöse Erkrankung des Menschen ab. Maßnahmen zur Bekämpfung der Rindertuberkulose hielt er für unnötig, weil seiner Meinung nach durch die Milch, Butter und das Fleisch tuberkulöser Kühe der Mensch nicht infiziert werde. Diese Auffassung wurde in den folgenden Jahren lebhaft diskutiert.

Einen wesentlichen Fortschritt brachte die Unterscheidung des Typus humanus und bovinus durch die Arbeiten von Koffel, Weber und Heus (nachdem 1898 bereits Smith auf morphologische und biologische Unterschiede zwischen den Bazillen aus menschlichem Auswurf und den von perlsüchtigen Rindern gezüchteten hingewiesen hatte).

Erst der biologische Nachweis von Rindertuberkelbazillen im menschlichen Organismus erbrachte den Beweis, daß Perlsuchtbazillen für den Menschen pathogen sind. 1908 auf dem Tuberkulosekongreß in Washington änderte Robert Koch seine Meinung und gab die Übertragbarkeit der Rindertuberkulose auf den Menschen zu. Er riet zu Untersuchungen über die Häufigkeit des Typus bovinus bei der Tuberkulose des Menschen.

Vier Jahre später berichtete Koffel über die Ergebnisse der Untersuchungen aus verschiedenen Ländern. Danach waren etwa 25% aller tödlich verlaufenden Erkrankungen an Tuberkulose bei Kindern unter 14 Jahren durch den Typus bovinus verursacht. Bei den Erwachsenen dagegen war der Perlsuchterreger auffallend selten gefunden worden und bei der Lungentuberkulose in einem nur unbedeutenden Prozentsatz.

Daraus ergab sich, daß praktisch nur Maßnahmen zum Schutz der Kinder gegen bovine Infektion getroffen werden mußten. Als Infektionsquelle wurde allgemein die Milch tuberkulöser Kühe an-

gesehen, deshalb eine systematische Überwachung und Entkeimung der Milch gefordert.

Bei der überaus weiten Verbreitung der Rindertuberkulose erregte die Frage der Häufigkeit der Infektion durch die Milch ganz besonderes Interesse. Legte man die Tuberkulinprobe zugrunde, so kam man auf über 70% tuberkulinpositiv reagierender Rinder in Deutschland. Mit dieser Probe erfaßte man die wirkliche Durchseuchung des Rindviehbestandes. Auf Grund der Fleischbeschauergebnisse für das Deutsche Reich errechnete Haupt für 1924 30%, Deich für die Provinz Sachsen den niedrigsten Prozentsatz offener Tuberkulose mit nur 12,8%.

Welche enormen Mengen Tuberkelbazillen in der Milch euter-tuberkulosekranker Rinder enthalten sein können, wies v. O f t e r t a g nach. Er injizierte Meerfischweinen Milch in Verdünnungen von 1 : 1000 bis 1 : 10 Millionen und konnte bei diesen noch eine tuberkulöse Erkrankung erzielen. Durch diesen Versuch hatte v. O f t e r t a g gezeigt, daß eine einzige tuberkulöse Kuh das gesamte Gemelk einer ganzen Viehherde und darüber hinaus die Gesamtmilch einer Sammelmolkerei mit Tuberkelbazillen verseuchen kann.

Ähnliche Versuche hat v. O f t e r t a g mit Milchprodukten angestellt, welche stets roh vom Menschen genossen werden, wie Rahm, Butter und Buttermilch. Hierbei ging er bei seiner Versuchsanordnung nur bis zu Verdünnungen von 1 : 10 000 und hatte dabei stets positives Impfergebnis. Durch diesen Versuch hat er bewiesen, daß die Tuberkelbazillen zu einem beträchtlichen Teil in den Rahm und auch in die Butter übergehen.

Die Bekämpfung der bovinen Infektion beim Menschen beschränkte sich im Gegensatz zu anderen Ländern, z. B. Amerika, in Deutschland auf die Ausmerzung offentuberkulöser Kühe und auf die Keimabtötung durch das Pasteurisierungsverfahren. Trotzdem wurden in Deutschland diese Maßnahmen vielfach nachlässig betrieben, da sie den örtlichen Gesundheitsbehörden vorbehalten waren.

Erst 1930 wurde ein Reichsmilchgesetz erlassen und damit eine staatliche Überwachung der Milchhygiene Tatfache. Das Tuberkulose-Bekämpfungsverfahren will durch klinische Untersuchung des Viehbestandes und durch Milchuntersuchungen zum Ziel kommen. Der gesamte Viehbestand soll fortlaufend allgemeinklinisch unter besonderer Berücksichtigung des Euters untersucht werden. Die Milchuntersuchungen gelten vor allem dem Tuberkelbazillennachweis. Mehrere Verfahren kommen in Betracht:

1. Der färbetische Nachweis aus dem zentrifugierten Milchsediment.
2. Die Züchtung auf speziellen Nährböden (nach S w e a n y - E v a n o f f).
3. Durch den Tierversuch.
4. Durch das Zellbild (T o r r a n c e hat als erster 1922 darauf aufmerksam gemacht, daß in der Milch eutertuberkulöser Kühe häufig Zellklumpen gefunden werden, die mit großer Wahrscheinlichkeit auf Eutertuberkulose hindeuten. Auch B o n g e r t wies 1928 auf das häufige Vorkommen von Lymphozyten in der Milch bei tuberkulöser Mastitis hin. Er empfahl den vermehrten Zellgehalt in der Milch (Lymphozyten und Epitheloidzellen) und ihre Lagerung in Zellgruppen als diagnostisches Hilfsmittel zur Feststellung der Eutertuberkulose).
5. Serologisch durch Feststellung tuberkulöser Antigene in der Milch (nach M e n c k und E p s t e i n).

In bestimmten kürzeren Zeitabständen wird Milchmilch eines gesamten Viehbestandes untersucht. Werden Tuberkelbazillen nachgewiesen, so stellt man Tierversuche mit Milchproben der einzelnen Kühe des betreffenden Viehbestandes an. Auf diese Weise ermittelt man den Bazillenausscheider.

Schröder, Rautmann und Scharf fanden in der Milch euterkranker Kühe häufig keine Tuberkelbazillen. Sie weisen darauf hin, daß die Bazillenausscheidung bei Eutertuberkulose nicht unaufhörlich stattfindet. Im Gegensatz zu v. O s t e r t a g, P r ö f c h o l d, E i k m a n n, L ü c k u. a. halten sie die diagnostischen

Milchuntersuchungsmethoden nicht für ausreichend. Andererseits betont L ü c k , daß trotz des Bazillenbefundes in der Milch nicht immer Eutertuberkulose vorliegen müsse.

Wie notwendig Milchhygiene ist, zeigen die Ergebnisse von Milchuntersuchungen, die K l i m m e r durch seine Mitarbeiter, H o f m a n n , F r i t s c h e und F a l k e vor Inkrafttreten des Gesetzes anstellen ließ. Sie sind in nachfolgender Tabelle zusammengefaßt:

Vorkommen von Tuberkelbazillen in der Milch.
(Zahl der untersuchten Milchproben: 195).

Marktmilch	33%
Pasteurisierte Milch	26%
Vorzugsmilch	18%

Die Zahlen für Vorzugsmilch (18%) bestätigte M e y n zu gleicher Zeit für dieselbe Stadt.

Tuberkelbazillen wurden demnach in erschreckend hohem Prozentsatz gefunden. Jede dritte Marktmilchprobe, jede vierte Probe pasteurisierter Milch und jede fünfte bis sechste Probe von Vorzugsmilch enthielt durch den Tierversuch nachweisbare Tuberkelbazillen.

Bakteriologisch ist die Milch von einer großen Anzahl inländischer und ausländischer Autoren untersucht worden. Bei der Auswertung ihrer Ergebnisse müssen die Untersuchungsbedingungen und vor allem die Zahl der Proben berücksichtigt werden, wenn man zu vergleichbaren Ergebnissen kommen will. Da diese Voraussetzungen nicht immer gegeben sind, erhält man nur ein ungefähres Bild. Die Zahlen haben nur Gültigkeit für den Untersuchungsbereich des betreffenden Autors.

Bei einer Zusammenstellung von über 5000 im Inland und Ausland untersuchten Marktmilchproben erhielt K l i m m e r eine Durchschnittszahl von 10%, die weit unter dem von ihm berechneten Reichsdurchschnitt von 18% liegt. O f t e r m a n n fand in der Literatur 953 Milchproben, die zu 12,4% Tuberkelbazillen enthielten. M o r t o n berichtet über das Ergebnis von 1500 Milch-

proben in Schottland. In roher Milch konnten in 6,5%, in pasteurisierter Milch in 4,8% Tuberkelbazillen nachgewiesen werden. Cornet hat 1500 Milch- und 775 Butteruntersuchungen zusammengestellt. Milch erwies sich in 9,8%, Butter in 12,9% tuberkelbazillenhaltig.

Die Pasteurisierungsverfahren zur Keimfreimachung der Milch werden lebhaft erörtert. Rossi konnte bei seinen Versuchen trotz des Dauererhitzens (eine halbe Stunde auf 60—63°) die Tuberkelbazillen nicht abtöten, sondern nur meerschweinchenavirulent machen. Auf Nährböden nach Petroff ließen sich die Bazillen weiterzüchten.

Ludwig Lange prüfte diese Befunde Rossis nach. Er fand unterschiedliches Verhalten nach dem Alter der Bazillensämme. Ältere Kulturen wurden erst bei höherer Temperatur abgetötet als jüngere.

Tierversuch und Züchtung auf dem Petroffschen Nährboden fielen gleichsinnig aus. Ein Virulenzschwund war für die die Erhitzung überlebenden Bazillen nicht festzustellen.

Savage hält die Pasteurisation der Milch vielfach für unzureichend, ein sicherer Weg zur Unschädlichmachung der Tuberkelbazillen in der Milch außer dem Aufkochen existiere noch nicht.

Rabinowitsch übt Kritik an der technischen Ausführung. Die Pasteurisierungsapparate, die unter den Händen von Sachkundigen gute Ergebnisse lieferten, versagten, sobald sie in großen Betrieben benutzt wurden. Sie fand in der Berliner Marktmilch in 14—30% der Proben Tuberkelbazillen, und die angeblich keimfreie „pasteurifizierte“ Milch war häufig nicht einwandfrei.

Als ausreichende Erhitzung genügen nach dem Reichsmilchgesetz folgende Pasteurisierungsverfahren:

1. Dauererhitzung auf 63—65° C. für die Dauer von mindestens einer halben Stunde.
2. Momenterhitzung in dünner Schicht auf mindestens 85° C.
3. Hoherhitzung für mindestens 1 Minute.
4. Kurzzeitpasteurisierung (ein neueres 1934 zugelassenes Verfahren, wobei die Milch in dünner Schicht auf Tempera-

turen von 71—74° erhitzt und durch besondere Heißhaltevorrichtungen kurze Zeit auf diesen Temperaturen gehalten wird.

Klimmer hat besonders auf die Gefahren bazillenhaltiger „pasteurisierter“ und „Vorzugsmilch“ hingewiesen. In der Annahme, daß in der Marktmilch Tuberkelbazillen enthalten seien, würde diese von den Verbrauchern vor dem Genuß meist aufgekocht, die Vorzugsmilch und pasteurisierte Milch dagegen vielfach roh getrunken, weil man sie allgemein für bazillenfrei hält.

Nach diesen in der Literatur niedergelegten Meinungen und Feststellungen ist die zum Genuß gelangende Milch mit ihren Nebenprodukten in einem erheblichen Prozentsatz mit Tuberkelbazillen verfeucht, Infektionsmöglichkeit durch Milch also dauernd gegeben.

Es ist nun zu untersuchen:

1. Wie häufig es zur bovinen Erkrankung beim Menschen kommt.
2. Ob jede bovine Infektion durch Milch und ihre Produkte verursacht wird und zur Erkrankung führt.

Der Infektionsweg der Tuberkulose war lange Zeit umstritten. Man hat vor allem tierexperimentell versucht, hier Klärung zu schaffen. Josef Koch und W. Baumgarten brachten tropfenweise Bazillenaufschwemmungen in das geöffnete Maul von Meerschweinchen und Kaninchen. Bei der Sektion zeigte sich, daß die Keime durch die unverletzte Schleimhaut in die Halslymphdrüsen gelangt sein mußten und nach Passage des Truncus lymphaticus superior sich in den Lungen angesiedelt hatten. Nach Beitzke ist dies der einzig gangbare Weg von den Halslymphdrüsen zur Lunge.

Calmette kam auf Grund von Tierversuchen zu der Auffassung, daß die Tuberkelbazillen durch die Interzellularräume der Darm Schleimhaut eindringen, die Darmwände spurlos passieren, sich in den Mesenterialdrüsen ansiedeln und hier die Primärherde hervorrufen.

Calmette erzeugte durch Sondenfütterung bei jungen Tieren Lungentuberkulose. Ähnliche Versuche stellten Orth und Rabinowitsch an Meerfchweinchen, Kaninchen, Ziegen und Schweinen an. Danach ist tierexperimentell ein Eindringen von Tuberkelbazillen durch die Schleimhäute des Magendarmtrakts und Erkrankung der Lunge möglich.

Daß dieser Infektionsweg nicht der gewöhnliche ist, zeigen die Untersuchungen einer Reihe von Autoren, darunter Beitzke.

Er gibt die Möglichkeit einer Infektion der Lungen durch Tuberkelbazillen zu, die die Lymphbahnen der Verdauungswege passieren und ins Blut gelangen, ohne an der Eintrittsstelle Spuren ihres Weges zu hinterlassen. Sicher bewiesen sei das Vorkommen eines solchen Infektionsweges und die praktische Bedeutung nicht beim Menschen. Eine rein lymphogene Infektion der Lunge von den Schleimhäuten des Verdauungstrakts aus lehnt er ab.

Bruno Lange benutzte gegenüber Koch und Baumgarten wesentlich geringere Infektionsdosen. Selbst bei 1/200 000 mg nasaler, oraler oder konjunktivaler Infektion wurde noch Erkrankung beobachtet. Eine Aspiration von Bazillen in die Lungen nimmt Lange bei seiner Versuchsordnung nicht an. Er brachte auch in Kontrollversuchen dafür den Beweis. Er infizierte Meerfchweinchen oral und überimpfte nach 1—3 Tagen Cervikal-, Mesenterial- und Tracheallymphknoten sowie Teile von Lunge und Milz auf andere Tiere. Auf diese Weise ließen sich wohl in Cervikal- und Mesenterialdrüsen, auch in der Milz, aber niemals in den Lungen oder Tracheallymphknoten Tuberkelbazillen nachweisen.

Trotz dieser Tatsachen betont B. Lange nur den bedingten Wert der pathologisch-anatomischen Befunde zur Feststellung der Eintrittspforte. Die Feststellungen der pathologischen Anatomen müßten ungenau sein, da sie ja nur aus den zur Zeit der Sektion noch vorhandenen spezifischen tuberkulösen Veränderungen in den Drüsen auf durchgemachte tuberkulöse Infektion schließen könnten. Demgegenüber betont Beitzke, daß sich tuberkulöses Granulationsgewebe nicht ohne Hinterlassung spezifischer Veränderungen zurückbilden könne. Er faßt seine Meinung folgendermaßen

zusammen: „Tuberkelbazillen werden verhältnismäßig oft in die regionären Drüsen des Verdauungsrohres aufgenommen, sie werden aber hier in der Regel vernichtet und führen weit weniger häufig zur tuberkulösen Erkrankung als beim Hineingelangen in die Bronchien und Lunge. Die Erklärung für dieses Verhalten liegt überaus nahe. Durch die ganz auf Resorption eingerichteten Schleimhäute des Verdauungskanals treten die Bazillen ohne Schwierigkeit hindurch und werden erst in den Lymphdrüsen aufgehalten. Hier gelangen sie sofort in ein Kampforgan, das bei günstigen Kräfteverhältnissen gut mit ihnen fertig wird und anatomisch nur mit einer lymphoiden Schwellung erkrankt“.

Tierexperimentelle Beobachtungen und pathologisch-anatomische Erfahrungen am Menschen haben in Übereinstimmung gezeigt, daß die direkte Infektion der Lungen auf dem Luftwege die bei weitem wichtigste Ansteckungsart ist. Sie beträgt nach pathologisch-anatomischen Beobachtungen in Deutschland im Durchschnitt 90% sämtlicher Infektionen.

Die neueren Forschungen auf tierexperimentellem, insbesondere aber auf pathologisch-anatomischem Gebiet haben endgültig die frühere Anschauung über das Zustandekommen einer Lungentuberkulose über den Weg des Darmtrakts, ohne hier spezifische Spuren zu hinterlassen, widerlegt. In sämtlichen Fällen, bei denen Tuberkulose im menschlichen Körper durch die Sektion festgestellt wird, läßt sich, wie dies besonders Schürmann wieder sehr überzeugend hat nachweisen können, ein Primärkomplex auffinden, der die Eintrittspforte des Bazillus kennzeichnet.

Niemals entsteht nach oraler Infektion ein Lungenprimärkomplex (wenn Aspiration vermieden wird). Es kommt immer zu einer primären Tuberkulose der Lymphknoten der Verdauungsorgane mit oder ohne Beteiligung der Schleimhäute.

Die Lübecker Säuglingstuberkuloseerkrankungen 1930 geben nach den vorläufig abgeschlossenen Untersuchungen von Schürmann und Kleinschmidt sicheren Aufschluß über den Infektionsweg.

Bei den 72 Kindern, die obduziert wurden, fand sich Mesenteriallymphknotentuberkulose und, außer in einem Falle, Darm-schleimhauttuberkulose. In 89% waren die Halslymphknoten bei den verstorbenen Säuglingen erkrankt, darunter in 78% primär. Häufig waren die Gaumen- und Rachentonfillen dabei beteiligt, in etwa der Hälfte der Fälle sogar primär. 21mal kam eine Mittelohrtuberkulose vor. 15 von den 72 verstorbenen Kindern hatten einen Lungenprimärkomplex. Kleinschmidt und Schürmann führen seine Entstehung auf Fehlschlucken zurück, wenn der Impfstoff mit dem Löffel gegeben und dabei zur Anregung des Schluckaktes die Nase zugehalten wurde. Auch diese Autoren lehnen danach eine Entstehung von pulmonaler Primärinfektion auf hämato-lymphogenem Wege ab.

1927 hat B. Möllers alle bis dahin in der Weltliteratur veröffentlichten Fälle von boviner Erkrankung beim Menschen statistisch ausgewertet. Von 2562 Fällen menschlicher Tuberkulose gehörten 339 Bazillensämme dem Typus bovinus an. Kinder bis zu 16 Jahren waren allein mit 59% daran beteiligt. Die höchsten Prozentzahlen fand er in abfallender Reihenfolge bei der Tuberkulose der Halsdrüsen, Abdominalorgane, Haut, Knochen und Gelenke, die niedrigsten bei der tuberkulösen Meningitis, Tuberkulose der Urogenitalorgane und der Lungen.

Nachfolgend die Tabelle von Möllers:

Diagnose	Zahl der unter- suchten Fälle	Kinder bis zu 16 J. bovine Bazillen	Zahl der unter- suchten Fälle	Erwachsene über 16 J. bovine Bazillen	insgesamt bovine Bazillen
Tuberkulose der Lungen und Bronchialdrüsen	90	2= 2,2%	1062	5= 0,4%	0,43%
Tuberkulose der Knochen und Gelenke	155	44=28,4%	51	1= 1,9%	19,6 %
General.-Tub.	268	29=10,8%	27	2= 7,4%	11,6 %
Meningitis Tbk.	48	4= 8,3%	7	0= 0%	6,89%
Tbk. der Hals- u. Achseldrüsen	159	54=34%	67	2= 3%	25,0 %
Tuberkulose der Abdominalorgane	119	47=40%	50	11=22%	33,0 %
Urogenital-Tbk.	2	0= 0%	37	1= 2,7%	2,56%
Lupus	36	15=41,6%	56	10=17,9%	22,76%
Schleimhaut-Tbk. (Mund u. Konjunk- tiven)	6	4=65,0%	3	1=33,3%	55,5 %

Aus dieser Zusammenstellung ist ersichtlich, daß die bovine Infektion in erster Linie eine Erkrankung des Kindesalters darstellt. Trotzdem glaubt Möllers, daß der Genuß perlsuchtbazillenhaltiger Milch nur selten zur Erkrankung führe. Zur Beweisführung erwähnt er eine Mitteilung von Heß aus Amerika. Heß beobachtete drei Jahre lang 18 Kinder im Alter von einem halben bis neun Jahren, die längere Zeit rohe Marktmilch getrunken hatten. Nur bei einem Kinde verursachte der Typus bovinus eine Halsdrüsentuberkulose. In Deutschland erkrankten von 687 Personen (davon waren 284 Kinder) nach dem Genuß von Milch eutertuberkulöser Kühe nur zwei an Halsdrüsentuberkulose.

Ausgeschlossen sei es nicht, daß trotzdem häufig eine Infektion stattgefunden hätte, ohne daß es zu klinisch faßbarer Erkrankung gekommen wäre.

Möllers empfiehlt, um zu einem verwertbaren Ergebnis zu gelangen, wahlloses Durchuntersuchen eines großen Sektionsmaterials.

In den letzten zehn Jahren sind von einer Reihe von Autoren Untersuchungen an großem Material vorgenommen worden. Nach ihren Ergebnissen muß man annehmen, daß die bovine Erkrankung beim Menschen doch häufiger vorkommt, als aus Möllers Statistik hervorgeht.

So hat 1936 Jensen (Dänemark) seine Beobachtungen über die Typenbestimmung bei 2890 Tuberkulosekranken aus den drei letzten Jahren veröffentlicht.

Häufigkeit der bovinen Infektion in Dänemark

(nach Jensen 1936).

Diagnose	0—15 Jahre		15—30 Jahre		über 30 Jahre		alle zusammen	
	Zahl der Fälle	davon bovine Bazillen	Zahl der Fälle	davon bovine Bazillen	Zahl der Fälle	davon bovine Bazillen	Zahl der Fälle	davon bovine Bazillen
Lungen-Tbk.	622	29= 4,8%	967	60= 6,2%	384	9= 2,3%	1973	98= 4,9%
Tbk. der Knochen Gelenke	78	24=39,0%	255	57=22,3%	214	24=11,2%	547	105=19,0%
Halsdrüsen-Tbk.	80	66=82,5%	97	47=48,4%	74	8=10,8%	251	121=48,2%
Meningitis-Tbk.	176	58=33,0%	89	13=14,6%	34	4=11,8%	299	75=25,0%

Hieraus ergibt sich die auffallend hohe Beteiligung des Typus bovinus an der Tuberkuloseerkrankung im Kindesalter in Dänemark. Halsdrüsentuberkulose wird in diesem Alter in 82,5%, tuberkulöse Meningitis in 33% der Fälle durch den Rindertuberkelbazillus verursacht. Bei 13 meningitiskranken Kindern unter fünf Jahren handelte es sich allein siebenmal, also über die Hälfte, um Perlfuchtinfection. Aber auch die Tuberkulose der Lungen, der Knochen und Gelenke weicht von dem Ergebnis der Zusammenstellung Möllers ab.

Blacklock hat 1935 die Sektionsbefunde von 2500 Kindern bis zu 13 Jahren mitgeteilt. Bei 372 Kindern wurde eine Tuberkulose diagnostiziert. In 32,4% der Fälle konnte der Sitz der

Erstinfektion im Abdomen und in 2,1% in den Halsdrüsen nachgewiesen werden. 149 Kinder waren an Lungentuberkulose gestorben, die Erkrankung sechsmal durch den Typus bovinus verursacht. Bei den 58 Abdominaltuberkulosen fand sich 47-mal, bei den acht Halsdrüsentuberkulosen dreimal der Typus bovinus. Griffith und Menton bestimmten bei 47 extrapulmonalen Tuberkulosen den Erregertyp und fanden vorwiegend den Typus bovinus. Unter 230 Sputumkulturen von Lungentuberkulosen wiesen sie dagegen nur zweimal bovine Tuberkelbazillen nach.

Savage fand bei 281 Todesfällen an Tuberkulose bei Kindern unter fünf Jahren 114mal den Typus bovinus, hingegen Rabinowitsch bei 1509 Tuberkulosefällen bei Kindern 596mal = 26% den Perlsucherreger. Bei Erwachsenen war die Tuberkulose nur in 6% (81) der Fälle durch den Typus bovinus verursacht. Price (Kanada) fand an kleineren Zahlen 14,1%, für Erwachsene 3,5%.

Mündel und Stempel (Schweiz) haben 1936 ihre Untersuchungsergebnisse mit denen anderer Autoren verglichen, so mit Jensen, Griffith, Munroe und Möllers. Es handelte sich bei ihren 200 Untersuchungen fast ausschließlich um Material von Erwachsenen. Dabei fanden sie unter Berücksichtigung der Altersklasse weitgehende Übereinstimmungen mit den Ergebnissen von Jensen, weniger eindeutige mit denen von Griffith.

Die bisher in der Literatur nur spärlich veröffentlichten Fälle über die Typendiagnose bei der Urogenitaltuberkulose haben durch Mündels und Stempels Untersuchungen eine wesentliche Bereicherung erfahren. Der Typus bovinus war in 5,2% bei den 58 Krankheitsfällen der Erreger. Verfasser legten bei allen ihren Fällen besonderen Wert darauf zu erforschen, ob vom Patienten rohe Milch genossen wurde. Sie erhielten eine eindeutige Antwort in 134 Fällen. Danach tranken von den bovinerkrankten Patienten 33¹/₃% häufig rohe Milch. Mündel und Stempel glauben, soweit die kleinen Zahlen eine Verallgemeinerung zulassen, an einen Zusammenhang von Milchgenuß und Erkrankung.

Nach allgemeiner Anschauung erfolgt die Infektion des Menschen mit Perlsuchtbazillen durch Milchgenuß vom Magen-Darmtraktus aus.

Erst 1931 hat Bruno Lange in einer Arbeit über „Perlsuchtbazillen als Erreger menschlicher Tuberkulose“ vier Fälle mitgeteilt, bei denen sich eine Lungentuberkulose mit bovinem Bazillenbefund im Auswurf ergeben hatte. Diese Personen waren durch ihren Beruf boviner Infektion besonders ausgesetzt. Er glaubt daher in diesen Fällen alimentäre Infektion ausschließen zu können und hält Tröpfchen- oder Staubinfektion für wahrscheinlich. Allerdings ist nur ein Fall autoptisch kontrolliert, bei dem sich keinerlei Anhaltspunkte für eine intestinale oder pulmonale Infektion in der Kindheit fand, sondern lediglich eine isolierte Lungentuberkulose.

Walker hat 1934 erneut darauf hingewiesen, daß der Beweis für eine bovine tuberkulöse Infektion, von Mensch zu Mensch übertragen, noch immer aussteht. Er fand 23mal, d. h. in 4%, bei Lungentuberkulosen den bovinen Typus. Nur bei vier Kranken, bei denen im Sputum bovine Tuberkelbazillen gefunden wurden, war ein weiteres Mitglied der Familie an Tuberkulose erkrankt, davon zwei an offener. Bei diesen wurden jedoch humane Tuberkelbazillen nachgewiesen. Eine Übertragung in der Familie hatte also keinesfalls stattgefunden.

Auch Jensen betont trotz seiner vielen positiven bovinen Bazillenbefunde beim Menschen, daß die Ansteckung mit dem Typus bovinus fast ausschließlich durch die Kuhmilch erfolge. Seine Untersuchungen, ob auch die direkte Berührung bzw. der Kontakt mit tuberkulösen Rindern die Häufigkeit der bovinen Infektion beim Menschen beeinflußt, sind noch nicht abgeschlossen.

1935 haben Jensen und sein Mitarbeiter Blegvad Erkrankungen an primärer Konjunktivaltuberkulose bei sechs Milchmädchen mitgeteilt, die alle durch den Typus bovinus verursacht waren.

Die Lungentuberkulose bovinen Ursprungs ist nach Jensens und Blegvads Ansicht in Dänemark keineswegs selten. Sie haben aus einem Zeitraum von 2 $\frac{1}{2}$ Jahren allein in der Stadt Kopenhagen 26 Fälle zusammengestellt. Die Mehrzahl betraf Per-

tionen unter 15 Jahren, dabei handelte es sich keineswegs um ausgewählte Fälle.

13 Kranke hatten vergrößerte Halslymphknoten, bevor das Lungenleiden aufgetreten war. Bezeichnenderweise waren das vorwiegend solche Patienten, die regelmäßig rohe Milch tranken. Drei Kranke erklärten, sie hätten niemals rohe Milch bekommen. Abdominelle Erkrankung bestand bei fünf Kleinkindern vor der Lungentuberkulose.

Verfasser nehmen bei der Mehrzahl ihrer Fälle von Lungentuberkulose Milchinfektion an. Nur bei einem glauben sie, daß die Ansteckung durch den tuberkulösen Vater erfolgt sei.

Griffith und seine Mitarbeiter wiesen neuerdings bei weiteren 10 Lungenkranken den bovinen Bazillentyp nach. Damit sind in England und Schottland insgesamt 49 Fälle von Lungentuberkulose boviner Genese mitgeteilt. Vor Ausbruch der Lungentuberkulose hatten anamnestisch 10 Kranke vergrößerte Nackendrüsen oder abdominelle Störungen. Bei einem Kranken ergab die Autopsie, daß die Mesenterialdrüsen als primärer Sitz der Infektion angesehen werden müssen, anamnestisch lagen bei diesem Kranken keine Halsdrüsenanschwellungen vor. Von den 49 Lungenkranken durch den bovinen Typ kamen leider nur sechs zur Autopsie. Bei 3 konnte mit Sicherheit der Verdauungstraktus als Eintrittspforte festgestellt werden. Verfasser nehmen an, daß es sich bei diesen Lungentuberkulosefällen um eine Spätmanifestation einer in der Kindheit durch den Verdauungstraktus erworbenen Infektion handle.

Price beobachtete sichere Tuberkuloseinfektion durch den Genuß roher Milch. Bei 30 Jugendlichen, die alle mit roher Milch ernährt wurden, fand er den Typus bovinus. In einigen Fällen gelang ihm der Nachweis virulenter Perlsuchtbazillen in der den Kindern zugänglichen Milch. Die Kinder stammten alle aus einer Gegend, in der die Milch nicht pasteurisiert wurde. Vergleichsweise vorgenommene Untersuchungen in einem anderen Ort, in dem seit zehn Jahren Pasteurisierungszwang besteht, ergaben dagegen negativen Befund.

Für Stockholm gibt Peterson an, daß im Gegensatz zu anderen Distrikten Schwedens, in denen die Pasteurisierung nicht erfolgt, Perlsuchtinfektion extrem selten vorkommt.

Anania dè s untersuchte die Häufigkeit der bovinen Infektion beim Menschen in Saloniki. Allerdings benutzte er zur Züchtung nur den Nährboden nach Petrag nani, nicht den Tierversuch. Bei 175 Tuberkulösen konnte er keinmal Erkrankung durch den Typus bovinus feststellen. Er führt die extreme Seltenheit der Bovinusinfektion darauf zurück, daß die Milch in Griechenland vor dem Verkauf aufgekocht werden muß.

Cumming berichtet über Sputumuntersuchungen von 320 Lungentuberkulösen in Irland. Dabei wurden nicht weniger als 97mal Tuberkelbazillen vom bovinen Typ ermittelt. Der weitaus größte Teil dieser Patienten kam beruflich viel mit Vieh in Berührung. Kindliche Tuberkulosen traten nicht besonders hervor.

Unter den 1502 Lungenkranken eines englischen Bezirkes wurden im Sputum dagegen nur 34mal bovine Bazillen nachgewiesen.

Munroe hat über das auffällig häufige Vorkommen von Perlsuchterkrankung beim Menschen in Schottland hingewiesen. In Ergänzung zu seinen Arbeiten untersuchten Griffith und Mitarbeiter vor allem Fälle aus ländlichen Bezirken. Die relativ starke Beteiligung der Rindertuberkelbazillen an der Tuberkulose in Schottland führen sie auf die Gewohnheit der Bewohner zurück, Früchte und Haferbrei vielfach mit roher Milch zu genießen sowie überhaupt viele rohe Milch zu trinken. Eine große Verbreitung der Rindertuberkulose gegenüber anderen Gegenden soll nach ungefäh rer Schätzung nicht in Betracht kommen. Die Zahlen für Westschottland liegen nach Blacklocks Mitteilungen noch ungünstiger. Bei Kindern bis zu 13 Jahren, die wegen chirurgischer Tuberkulose in Behandlung standen oder die zur Sektion kamen, wurden die Tuberkelbazillen bestimmt. Bei abdominalen Tuberkulosefällen fand sich in 80,4% der Typus bovinus. Die meisten Kinder waren unter zwei Jahre alt. Cervikaldrüsentuberkulose war in 64,3%, Knochen- und Gelenktuberkulosen in 34,6% der Fälle durch den Typus bovinus verursacht. Für Stadt- und Landkinder wird ein

Unterschied angegeben zugunsten der Stadtkinder, hier ließ sich in 70,8%, bei Landkindern in 82,6% der Typus bovinus nachweisen. Blacklock führt die für die Stadtkinder etwas günstigere Zahl auf die Pasteurisierung der Milch in der Stadt zurück.

Über die Häufigkeit der bovinen Infektion in den Niederlanden liegt 1936 eine Mitteilung von Ruyss vor. Sie fand im Magensaft von 119 tuberkulosekranken Kindern 9mal den Typus bovinus. Allein in acht Fällen handelte es sich dabei um Kinder unter fünf Jahren.

Aus verschiedenartigem tuberkulösen Material wie Drüsen-, Knochen- und Gelenkeiter, Urin, Ascites und Rückenmarkflüssigkeit konnte sie unter 66 Patienten 11mal den bovinen Bazillus isolieren. Eine Ansteckungsquelle wurde in der Umgebung der Kranken nicht gefunden. 21 gaben den Genuß roher Milch zu, drei waren Metzger.

Die stärkere Beteiligung der Landbevölkerung an der bovinen Erkrankung geht aus Sputumuntersuchungen hervor. In dem Auswurf von 115 Erwachsenen aus Amsterdam fand sich 3mal der Typus bovinus, dagegen 10mal bei 89 Bewohnern ländlicher Orte Nordhollands. Alle hatten rohe Milch oder daraus hergestellte Milchprodukte genossen.

Daß in anderen Ländern die bovine Infektion jedoch seltener ist, zeigen Untersuchungen von Jansco und Elfer. Unter 94 Fällen von menschlicher Tuberkulose in Koloszwär (Siebenbürgen) fanden sie nicht ein einziges Mal den Typus bovinus. Verfasser führen die Seltenheit der Perlsuchtinfektion darauf zurück, daß bei dem siebenbürgischen „grauen Rindvieh“ Tuberkulose äußerst selten vorkommt.

Gea berichtet, daß in China die extrapulmonale Tuberkulose nicht durch bovine Tuberkelbazillen verursacht würde. Die Kuhmilch gehöre nicht zu den gebräuchlichen Nahrungsmitteln der Chinesen, sie würde außer in den großen Städten von ihnen kaum oder überhaupt nicht getrunken.

Bei der bovinen Infektion kann eine Inhalations- oder Schmierinfektion auch direkt von Tier zu Mensch vorkommen. Daß dieser

Infektionsmodus vorkommt, geht aus Bruno Langes Material sowie aus dem von Cumming hervor.

Jensen beobachtete einen ähnlichen Fall: ein 23jähriger Landwirt, in dessen Familie Tuberkulose nicht bekannt ist, erkrankte an einer tuberkulösen Blepharitis, nachdem er beim Reinigen eines Viehstalles Staub in die Augen bekommen hatte. 14 Tage später kam es zur Schwellung der linksseitigen Halslymphdrüsen. Aus dem Drüsenpunktat wurden bovine Tuberkelbazillen gezüchtet.

Piascka berichtet u. a. auch über vier bovine Infektionen, bei denen ihm der Infektionsmodus ohne weiteres erklärbar schien. Als Berufsinfektion spricht er eine Hauttuberkulose und eine Lymphangitis tuberculosa nach Verletzung bei Schlächtern an. Die beiden anderen Kranken hatten längere Zeit rohe Milch getrunken und erkrankten an Lupus bzw. perinealer Fistelbildung.

Neue Untersuchungen über den Erregertyp bei Lungentuberkulosen in Deutschland hat kürzlich Goeters mitgeteilt. Aus Sektionsmaterial gelang es ihm, bei 135 gezüchteten Tuberkelbazillenstämmen die Typenzugehörigkeit zu bestimmen.

Unter 67 Fällen von chronischer Lungentuberkulose mit ausgedehnter Kavernenbildung fand er viermal, unter 51 Alters-tuberkulosefällen zweimal den Typus bovinus als Erreger, während bei den übrigen Fällen von frischer Lungen- und Miliartuberkulose der Nachweis nicht gelang. Verfasser weist auf die Übereinstimmung mit den Ergebnissen von Griffith in England und Munroe in Schottland hin, die auch in etwa 4% ihrer Untersuchungen den Perlsuchtbazillus als Erreger der menschlichen Lungentuberkulose fanden.

Zweimal handelte es sich bei den Fällen mit chronischer Lungentuberkulose um Kinder. Der Sektionsbefund, käsige Tuberkulose der Mesenteriallymphdrüsen, sprach einwandfrei für eine Fütterungstuberkulose.

Bei den beiden Erwachsenen handelte es sich um landwirtschaftliche Arbeiter. Hier hält Verfasser Tröpfchen- oder Staubinfektion durch den Umgang mit tuberkulösem Vieh für wahrscheinlich.

Bei den zwei Fällen von Alterstuberkulose — beide waren von Beruf Landarbeiter — lag einmal Mischinfektion von *Typus bovinus* und *Typus humanus* vor. Aus den gleichzeitig vorhandenen Darmgeschwüren konnte nur der bovine Typ nachgewiesen werden. Verfasser hat Grund zur Annahme, daß die Darmprozesse älter waren und daß die Erkrankung der Lungen metastatisch vom Darm aus erfolgt sei.

Bei dem letzten Fall ließen sich am Verdauungstraktus keine Veränderungen nachweisen, die auf eine Infektion auf diesem Wege schließen ließen.

Bedingt durch den Infektionsmodus ist der bovine Anteil bei der Halsdrüsen- und Mesenterialdrüsentuberkulose besonders hoch. Bei allen Untersuchern liegt er weit über 50%.

Mitchell fand in Edinburgh mit 90,2% die größte Häufigkeit, Rabinowitsch in Berlin während des Krieges in 83,3% den *Typus bovinus* als Erreger der primären intestinalen Tuberkulose. Nach Jensen ist in Dänemark bei Kindern unter 15 Jahren die Halsdrüsentuberkulose in etwa 82% durch den *Typus bovinus* verursacht. Blacklock gibt 64,3%, und die englische Tuberkulose-Kommission 1924 für Kinder bis zu fünf Jahren, 87,5% an.

Beitzke hält die Hälfte aller Halsdrüsentuberkulosen für Perlfuchtsinfektionen. Die recht auffälligen Abweichungen in den Ergebnissen der einzelnen Autoren sind z. T. durch die Art der Untersuchung und die Verschiedenheit des Materials bedingt.

Da die Kuhmilch in der Hauptsache von Kindern getrunken wird, so ist es leicht verständlich, weshalb hauptsächlich bei der kindlichen Tuberkulose der *Typus bovinus* gefunden wird. Auffällig geht das aus den Untersuchungen von Price in Kanada hervor. Von 87 Drüsentuberkulosen waren 23, bei Kindern unter 14 Jahren unter 29 Fällen allein 20 bovinen Ursprungs.

Lührs behauptet, es sei statistisch erwiesen, daß, wenn Kinder aus einer tuberkulosefreien Familie erkrankten, in 83% der Fälle die Ansteckung durch die Kuhmilch erfolgt sei.

Schittler wies in einer Arbeit „über die Bedeutung der Tonfillen als Eintrittspforte der Tuberkulose“ darauf hin, daß die primäre Mandeltuberkulose nicht so selten ist, wie bisher angenommen wurde. In 98 Fällen von auf Tuberkulose verdächtigen Lymphdrüenschwellungen am Hals wurden die Tonfillen histologisch untersucht und 48mal sichere Tuberkulose nachgewiesen. Dabei ist besonders interessant, daß sich tuberkulöse Geschwüre nie auf den Tonfillen fanden und nur zweimal der makroskopische Befund Verdacht auf Tuberkulose erweckte. Die meisten Patienten waren unter 20 Jahre alt. Lungen tuberkulose oder sonstige Zeichen einer manifesten Tuberkulose wurden bei keinem nachgewiesen.

Schittler betont den überaus chronischen Verlauf der tuberkulösen Tonfillitis. Es komme in den meisten Fällen nur zu einer Lymphadenitis am Kieferwinkel ohne wesentliche Erscheinungen von seiten der Mandeln. Dabei zeige die primäre Tonfillitis tuberculosa im allgemeinen große Tendenz zur Ausheilung. Leider ist in obigen Fällen eine Untersuchung auf die Typenzugehörigkeit unterblieben.

Price fand 4mal bovine Stämme bei tuberkulöser Tonfillitis unter 14 Fällen.

Die Häufigkeit der Mundschleimhauttuberkulose bei fistelnder Halsdrüsentuberkulose untersuchten Burckhard und Bahl. Unter 68 Kindern fanden sich 17mal tuberkulöse Herde in der Mundschleimhaut, darunter 12mal in der Umgebung eines kariösen Zahnes oder in einer Extraktionslücke. Verdacht auf tuberkulöse Erkrankung wurde auf Grund des makroskopischen Befundes bereits geäußert, durch histologische Untersuchung sichergestellt. Für die Entstehung nehmen die Autoren allerdings an, daß die Ansiedlung von Tuberkelbazillen aus dem Blut an dem durch die Karies oder die Zahnextraktion geschaffenen locus minoris resistentiae erfolgte; erst sekundär erkrankten die Halsdrüsen. Auch hier fehlt leider Bazillentypisierung.

Bichlmayer hat kürzlich auf die Bedeutung des Zahnsystems als Eintrittspforte tuberkulöser Infektion besonders hingewiesen. Er hält die primäre Zahnfleisch tuberkulose für garnicht so selten. Von 251 Fällen von Zahnfleisch tuberkulose, die Bern-

st ein aus der Literatur zusammengestellt hat, waren 75 als primär anzusehen. Bei Kindern würde diese Erkrankung am meisten gefunden, weil die junge Mundschleimhaut und die Milchzähne besonders gute Bedingungen zur Infektion schaffen.

Interessant sind die Ergebnisse der Lupusuntersuchungen. Die englische Tuberkulose-Kommission berichtete 1911 über 20 Lupusfälle, von denen sich neun als bovine erwiesen. Das erregte damals in Deutschland großes Aufsehen, wo Perlsucht Fälle bei Lupus in einem so großen Prozentsatz bis zu Kirchner's Veröffentlichung 1922 nicht gefunden wurden. Kirchner wies unter 23 Lupusfällen in Schlesien 12mal den Perlsuchtbazillus als Erreger nach.

Griffith hat bis jetzt 188 Lupusfälle untersucht, 93mal wurde der Typus bovinus gefunden.

Angeregt durch Kirchner haben in Deutschland eine Reihe von Autoren ähnliche Untersuchungen angestellt. Eine Nachuntersuchung Ledermanns an Kranken aus Schlesien hat erheblich weniger bovine Erreger ergeben. Rabinowitsch hat unter 15 Fällen dreimal bovine Ansteckung nachgewiesen.

Stürz hat in jüngster Zeit noch 21 Fälle von Hauttuberkulose mitgeteilt. Siebenmal wurde der humane, achtmal der bovine Tuberkelbazillus nachgewiesen. Einmal handelte es sich um eine Mischinfektion mit beiden Typen, fünfmal fiel der Tierversuch negativ aus. Bei vergleichender Betrachtung zeigten sich die Fälle mit dem Typus bovinus im allgemeinen von größerer Bösartigkeit und geringerer Heilungstendenz.

Über Typenbestimmung bei Meningitis tuberculosa liegen in Deutschland nur spärliche Untersuchungen vor. Griffith untersuchte die Zerebrospinalflüssigkeit von 29 Kindern und einem Erwachsenen mit tuberkulöser Meningitis auf den Erregertypus mittels Verimpfung auf Meerfischweinchén wie durch direktes Kulturverfahren. Er fand, daß der Erwachsene sowie 20 von den 29 Kindern mit bovinen Bazillen infiziert waren.

Die Gesamtzahl aller bisher von Griffith untersuchten Meningitisfälle beträgt jetzt 139. Danach werden in England 23,7% aller tuberkulösen Meningitiden durch den Perlsucherreger ver-

urteilt. Wenn man auch diesen Berechnungen wegen der sehr kleinen Zahlen einen nicht allzu großen Wert beimessen kann, so geben sie doch einen Hinweis, wie bedeutungsvoll die bovine Infektion sein kann, daß sie nicht zu leichten, sondern auch schweren tödlich verlaufenden Erkrankungen führt.

Laport und Maupetit berichten über zwei Fälle von tuberkulöser Meningitis, bei denen durch Züchtung und Tierversuch bovine Tuberkelbazillen nachgewiesen werden konnten. Es handelte sich um ein dreijähriges Kind, das sterbend eingeliefert wurde. Im zweiten Falle stammte das Kind aus sicher gesunder Familie und gedieh sechs Monate bei Brustmilchernährung einwandfrei. Mit dem Umsetzen auf Kuhmilch begann es zu kränkeln und starb im Alter von 18 Monaten an generalisierter Tuberkulose.

Nach all diesen in der Weltliteratur niedergelegten Beobachtungen ist die bovine Tuberkuloseerkrankung beim Menschen weit häufiger, als bisher gemeinhin angenommen wurde.

Ausschlaggebend für die Erkrankung ist außer dem Infektionsweg das Alter des Menschen. Im Gegensatz zu früher muß heute zugegeben werden, daß auch andere Infektionsmöglichkeiten als die durch Fütterung von Milch und ihren Nebenprodukten zur Erkrankung führen. Allerdings ist die Infektion durch Milch die bei weitem häufigste. Virulente Tuberkelbazillen in der Kuhmilch führen nicht, wie R. Koch meinte, zur Immunisierung gegen Tuberkuloseerkrankung. Es muß vielmehr angenommen werden, daß der Typus bovinus hinsichtlich seiner Pathogenität dem Typus humanus nicht unbedingt nachsteht. Warum es nur gelegentlich zur bovinen Erkrankung kommt, trotzdem häufig Gelegenheit zur Infektion besteht, läßt sich heute noch nicht sicher sagen.

Anschließend werden zwei Beobachtungen aus der Medizinischen Klinik Bonn mitgeteilt, in denen der Infektionsmodus besonders interessant ist (siehe darüber auch Veröffentlichung von A. Heymer im Druck in M.M.W.!).

Es handelt sich um zwei Brüder. Beide sind im landwirtschaftlichen Betrieb ihres Vaters beschäftigt. Sie erkrankten gleichzeitig

an einer Schwellung der rechtsseitigen Halslymphknoten. Tuberkulose ist in der Familie nicht bekannt.

1. J. M., 24 Jahre alt.

Vorgeschichte: Bisher immer gesund gewesen. Im Mai 1935 trat eine Schwellung der rechten Halslymphknoten auf, die zunächst schmerz- und reizlos war. Der untersuchende Arzt verordnete zunächst Wärme und Ichtholan, die aber keine Heilung brachten. Im Oktober wurde die Schwellung schmerzhaft, es trat Rötung und stärkere Infiltration der Umgebung auf. Dreimal wurde eine Punktion vorgenommen, bei der sich einige Kubikzentimeter eitriger Flüssigkeit entleerten, Heilung trat aber nicht ein.

Am 23. I. 1936 wurde Patient in die Medizinische Klinik zu weiterer Behandlung eingewiesen.

Befund bei der Aufnahme: Kräftiger Patient in gutem Ernährungs- und Allgemeinzustand. Haut und sichtbare Schleimhäute gut durchblutet. Mäßig entwickeltes Fettpolster.

An der rechten Halsseite zwei etwa fünfmarkstückgroße, derbe, flächenhafte Infiltrationen ohne akute Reizerscheinungen. Geringe Fluktuation nachweisbar. An den Augen bestand rechts eine leichte Schwellung und Rötung des unteren Lides. Die Nasenatmung war frei. Zunge feucht, nicht belegt. Tonsillen beiderseits etwas vergrößert. Der Brustkorb zeigt beiderseits gleichmäßige und ausreichende Atembewegungen. Die Lungengrenzen waren regelrecht und gut verschieblich; perkutorisch über beiden Lungen sonorer Klopfschall und reines Bläschenatmen. Herzgrenzen normal, Aktion regelmäßig. Töne rein.

Blutdruck: 130/75 mm Hg R.R.

Der Leib war weich, gut eindrückbar, nirgends Druckschmerz, keine pathologische Resistenz. Leber und Milz perkutorisch nicht vergrößert. Nierengegend beiderseits frei.

Blutkörperchen senkungsgeschwindigkeit: normal 3:10:67 (nach Westergreen).

Blutbefund: 93% (Leitz) Hämoglobin, 4,94 Millionen rote Blutkörperchen, 5400 Leukozyten; Differentialblutbild: 3% Stab-

kernige, 65% Segmentkernige, 3% Eosinophile, 26% Lymphozyten, 3% Monozyten.

Röntgenologisch: Inaktive spezifische Prozesse in beiden Oberfeldern nicht absolut auszuschließen. Für pathologische Prozesse an Thoraxorganen kein Anhalt.

2. H. M., 19 Jahre alt.

Auch er war früher immer gesund gewesen. Bei ihm war gleichzeitig mit der Erkrankung seines Bruders eine Schwellung der rechten Halslymphdrüsen aufgetreten. Wärme und Salbenbehandlung hatten auch hier die Drüsen nicht zum Abschwellen gebracht. Nach der Punktion bildete sich an der Einstichstelle eine Fistel, aus der sich dauernd eitrige Flüssigkeit entleerte.

An den inneren Organen, insbesondere an den Lungen, konnte bei der klinischen Untersuchung ein krankhafter Befund nicht erhoben werden. Temperatur normal.

Blutflussgeschwindigkeit war normal 4:9:24 (nach Westergreen). Urin: o. B.

Röntgenbefund der Lungen: Alte inaktive Prozesse in beiden Spitzen nicht sicher auszuschließen; sonst für pathologische Prozesse an Thoraxorganen kein Anhalt.

Von beiden Kranken wurde nach Probeexzision tuberkulöses Material sowie Drüseneiter zur Typenbestimmung an das Robert-Koch-Institut Berlin (Prof. L a n g e) gesandt. Dort wurde in beiden Fällen im Kulturversuch auf Differentialnährböden ein für Typus bovinus charakteristisches Wachstum festgestellt. Durch Überimpfung der auf dem Nährboden gewachsenen zwei Bazillenstämme auf Kaninchen wurde die Diagnose Typus bovinus bestätigt.

Die gleichzeitige und gleichartige Erkrankung der Brüder ließ den Verdacht auf eine gemeinsame Infektionsquelle aufkommen. Eingehende Nachforschungen stellten als Ausgangspunkt für die Ansteckung mit dem Typus bovinus eine an Eutertuberkulose erkrankte Kuh in dem betreffenden Viehbestand fest. Daß es sich hier um eine alimentäre Milchinfektion gehandelt hat, geht aus der Anamnese hervor. Beide Kranke hatten heimlich beim Abmelken

rohe Milch dieser Kuh genossen. Dabei war ihnen aufgefallen, daß sie sich gegenüber früher schlechter melken ließ, und daß die Milch kleine Klümpchen enthielt. Die anderen Familienmitglieder hatten die Milch nur in gekochtem Zustande getrunken.

Die Möglichkeit eines anderen Infektionsmodus läßt sich nicht sicher ausschließen, besonders nicht bei dem älteren Bruder. Der Patient kam häufig beim Melken in direkte Berührung mit der Infektionsquelle; durch Schmier- oder Staubinfektion beim Reinigen des Stalles können Bazillen in den Konjunktivalfack, ähnlich wie bei dem von J e n s e n beschriebenen Fall, gelangt sein, hier die Entzündung des rechten Unterlides ausgelöst und schließlich zur Erkrankung der rechtsseitigen Halslympknoten geführt haben.

In der Mundhöhle und im Rachen konnten bei der klinischen Untersuchung tuberkulöse Geschwüre oder Granulationen nicht nachgewiesen werden, es sei, daß man die etwas vergrößerten und geschwollenen Tonsillen bei dem älteren Patienten als vielleicht spezifisch erkrankt ansehen will. Alles das spricht nicht gegen die Mundhöhle und den Rachen als Eintrittspforte der Infektion.

Zusammenfassung.

Es wird aus der Literatur über die Tuberkuloseinfektion durch Milch berichtet. Die heute übliche bakteriologisch-ferologisch-zelluläre Milchuntersuchung ergibt in etwa 10—18% positiven Bazillennachweis bzw. Anhaltspunkte für Tuberkuloseinfektion der Milch.

Die durch das Milchgesetz von 1930 zugelassenen Pasteurisierungsverfahren werden besprochen. An Hand von Beobachtungen mehrerer Untersucher wird auf ihre Unzuverlässigkeit bei der technischen Ausübung im großen gegenüber dem Laboratoriumsversuch hingewiesen.

Sodann wird versucht, die Häufigkeit der bovinen Erkrankung statistisch zu erfassen unter Berücksichtigung des Infektionsmodus. Danach kommt es vorwiegend durch Fütterung zu boviner Infektion im Kindesalter. Die Häufigkeit der bovinen Erkrankung in den verschiedenen Ländern ist vor allem von der Art des Milchgenusses (ob roh oder gekocht) abhängig, in zweiter Linie von dem Durchseuchungsgrad des Rindviehs. Bovine Erkrankung kommt demnach häufiger vor, als bisher allgemein angenommen wurde. Dem Typus bovins muß für den Menschen eine ähnliche Pathogenität zugestanden werden wie dem Typus humanus.

Anschließend werden zwei Beobachtungen aus der Medizinischen Klinik Bonn mitgeteilt, in denen es durch Milchgenuß zu einer Halslymphknotenerkrankung durch Typus bovinus kam.

Es ist mir eine angenehme Pflicht, Herrn Prof. Martini und Herrn Dozent Dr. Heymer für die Überlassung des Themas und der Krankengeschichten sowie für die Unterstützung bei Anfertigung der Arbeit zu danken.

Dem Westdeutschen Tuberkulose-Forschungsinstitut gebührt Dank für die freundliche Unterstützung bei Beschaffung der Literatur.

Literaturverzeichnis.

1. Ananiadès: Untersuchungen über das Vorkommen tuberkulöser Bovinusinfektionen des Menschen in Saloniki. C. r. Biol., Paris 117, 1934.
2. Bang: Über die Bedeutung der Entdeckung des Tuberkelbazillus für die Bekämpfung der Haustiertuberkulose. Ztschr. f. Tbk. 64, Seite 87.
3. Beitzke: Über die Infektionswege der Tuberkulose. Ztschr. f. Tbk. Bd. 37. S. 402; Ztschr. f. Tbk. Bd. 42, 1925; Ztschr. f. Tbk. Bd. 43, S. 183.
4. Bichlmayer: Zahnsystem als Eingangspforte tuberkulöser Infektion. Dtsch. Tbk.-Bl. 1935.
5. Blacklock: Über das Vorkommen des humanen und bovinen Typus der Tuberkuloseinfektion bei Kindern in Westschottland. Edinburgh med. J. 39, 1932; Brit. J. Tbk. 29, 1935.
6. Blegvåg und K. A. Jensen: Ugeskr. Laeg 97, 1935.
7. Burkhardt und E. Bahl: Über die Häufigkeit der Mundschleimhauttuberkulose bei offenen Halsdrüsen. Schw. med. Wschr. 1934, Nr. 8.
8. Cumming; W. Melrose: Tubercle. 17, Nr. 2, 1935.
9. Daddiet di Natale: Das Forschen nach dem bovinen Bazillus bei der menschlichen tuberkulösen Infektion. Lotta Tbc. 4, 841 bis 863 (1936).
10. Deich: Dtsch. tierärztl. Wschr. 1932, Nr. 4349.
11. Ehrlich: Kann Eutertuberkulose am Zellbild der Milch erkannt werden? Ztschr. f. Infektionskrankheiten und Hygiene der Haustiere. Bd. XLIX H. 2, S. 97.
12. Eickmann: Dtsch. tierärztl. Wschr. 1932, S. 657.
13. Epstein: Tuberkulose-Antigene in der Milch tuberkulöser Kühe. Jb. Kinder Bd. 95.
14. Gear, H. S.: Tuberculosis in China. China med. J. 49, Nr. 5, 1935.
15. Goeters: Klin. Wo. 1936, Nr. 2, S. 45.
16. Griffith, A. St.: Tuberkulöse Meningitis. J. of Path. 35, 1932.
17. Derfelbe: Beobachtungen über den bovinen Tuberkelbazillus bei menschlicher Tuberkulose. Brit. med. J. 1932, Nr. 3740.
18. Derfelbe: Menschliche Tuberkulose mit Typus bovinus. Edinburgh med. J. 39, 1932.
19. Derfelbe: J. of Path. 31, 1929.
20. Derfelbe and J. Menton: Brit. med. J. 1936, Nr. 3923.
21. Derfelbe and Munroe: Lancet Bd. 214, 1928.
22. Derfelbe and Munroe: Lancet 1933 I. 399—403.

23. Derfelbe and J. Smith: Bovine Phthisis. Lancet 1935, II. 1339 bis 1342.
24. Groh, E.: Über das Vorkommen der Perluchtbazillen bei menschlicher Tuberkulose. Ztschr. f. Tbk. Bd. 74.
25. Gundel: Die Bedeutung des Typus bovinus für die menschliche Tuberkulose. Zbl. f. d. gef. Tbk.-forschung. 40, 1934, S. 161-172.
26. Hämel: Rindertuberkelbazillen als Erreger eines Lupus vulgaris und einer gleichzeitig bestehenden Lungentuberkulose. Med. Klin. 1934, I. 328—330.
27. Herzberg, K.: Tuberkuloseverbreitung und Milchhygiene. Tbk.-Fürforgeblatt, 1933.
28. Jensen, K. A.: Die Bedeutung der bovinen Infektion. Ugeskr. Laeg 97, Nr. 7, 204, 1935; Ugeskr. Laeg 1932; Acta tbk. scand. 8, 1934; Zbl. f. Bakteriologie. 125, S. 222, 1932.
29. Johnston, A. and H. D. Chadwick: Kindliche Tuberkulose in Detroit. Amer. Rev. 28, Nr. 2, 1933.
30. Kirchner, M.: Ztschr. f. Hygiene, Bd. 98, S. 447.
31. Klimmer, M.: Beiträge zur Milchhygiene. Klin. Wo. 1931, Nr. 43, 1994.
32. Köhlisch: Über die Bedeutung der Milch für die Verbreitung der Tuberkulose. Ztschr. f. Hygiene, 1916, Bd. 81.
33. Kuhlmann: Die diagnostische Auswertung des Zellbildes der Milch bei der tuberkulösen Euterentzündung des Rindes. Münch. tierärztl. Wo. 87, 1936, S. 229—233.
34. Lange, Bruno: Über die Infektionswege der Tuberkulose. Ztschr. f. Tbk. Bd. 43, S. 176.
35. Derfelbe: Perluchtbazillen als Erreger menschlicher Tuberkulose. Dtsch. med. Wo. 1931, I. 921—925.
36. Lange, Ludwig: Zur Frage der Hitzebeeinflussung von Tuberkelbazillen. Zbl. f. Bakt. Bd. 114, 361—372.
37. Laporte, R. et J. Maupetit: Zwei Fälle von tuberkulöser Meningitis durch den Typus bovinus. C. r. Soc. Biol. Paris, 120, 1935.
38. Leclainche, E.: Le lait et la tuberculose humaine. Rev. gén. Méd. vét. 79, 1932.
39. Legendre: Tuberculose bovine et humaine. Presse méd. Nr. 71, 1362.
40. Lück: Zur Untersuchung von Gesamtmilchproben auf Tuberkelbazillen. Tierärztl. Rdsch. Nr. 49, 1933.
41. Lührs: Die Bedeutung der tierischen Tuberkulose für den Menschen. Tierärztl. Wo. 43, 1935.

42. Meyn: Untersuchung über Kurzzeiterhitzung der Milch. Dtsch. tierärztl. Wo. 43, 1934.
43. Mitschel: Tuberculous milk in Edinbourgh. Vet. Rec. u. Brit. med. J. 1914: Edinbourgh med. J. 13, 209.
44. Morrison, J.: Lancet, 1928, II.
45. Morton, W. H.: Transactions of the Tuberculosis Society of Scotland. 1931/32.
46. Möllers, B.: Handbuch der pathogenen Mikroorganismen. 1928. Bd. 5, II, S. 616—709.
47. Mündel und W. Stempel: Der bovine und humane Typus des Tuberkelbazillus bei menschlicher Tuberkulose. Ztschr. f. Hygiene, Bd. 117, S. 139—148.
48. Ostermann: Ztschr. f. Hygiene, Bd. 60, S. 411.
49. Piasecka-Zeyland: Häufigkeit der bovinen Infektion beim Menschen. Beitr. Klin. Tbk. 86.
50. Pierfrancesco Zuecola: Riv. Pat. et Clin. Tbk. 1934, Nr. 4, S. 330.
51. Price: Tuberkelbazillentypen bei menschlicher Tuberkulose. Can. J. Ref. 7, 1932; Americ. Rev. Tbk. 25.
52. Rabinowitsch, Lydia: Die Übertragung der Tuberkulose durch Haustiere. Americ. Rev. of tubercul. Bd. 15. Fortschr. d. Med., Jg. 44, Nr. 36, S. 1398, 1926.
53. Rautmann: Die Beurteilung der Tuberkulosebekämpfung in der Provinz Sachsen auf Grund staatlicher Erhebungen. Dtsch. tierärztl. Wschr. 1932.
54. Derfelbe: Milchhygiene und Tuberkulosefütterungsverfahren. Tierärztl. Rdsch. 1931, Nr. 24, S. 420.
55. Roodhous-Gloyne: The presence of the tubercle bazillus in milk. Tubercle 13, 1932, Nr. 10/11.
56. Reports on the public healt Nr. 63, London 1931: A memorandum on Bovine Tuberculosis in man with speciell reference to infection by milk.
57. Ruys, A.: Charlotte: Die Häufigkeit der durch den Typus bovinus beim Menschen hervorgerufenen Tuberkulose. Nederl. Tijdschr. Geneesh 1936, S. 364—369.
58. Savage: Methoden zur Eindämmung der menschlichen Tuberkulose bovinen Ursprungs. Brit. med. J. 3584, 1929, S. 492—495.
59. Selfter und Blumenberg: Infektionswege und Infektionsquellen. Handbuch d. pathog. Mikroorganismen. 1928, Bd. V., II.
60. Schittler, E.: Über die Bedeutung der Tonfille als Eintrittspforte der Tuberkulose. Schweiz. med. Wo. 1934.

61. Silberfchmidt: Über die Infektionswege bei der Tuberkulose. Schweiz. med. Wo. 1933, I.
 62. Schumann: Tierärztl. Rdsch. 1932, Nr. 42.
 63. Schürmann, P. und H. Keinfchmidt: Pathologie und Klinik der Lübecker Säuglingstuberkuloseerkrankungen. Verlag von J. Springer, 1935.
 64. Tobiefen-Jensen-Lassen: Bovine Lungentuberkulose beim Menschen. Tubercle 16, Nr. 9, 1935.
 65. Walker, J.: Über das Fehlen des Beweises der durch den bovinen Typ des Bazillus hervorgerufenen Tuberkulose des Menschen. Brit. med. J. 1934.
-

Lebenslauf.

Ich, Hans Surmann wurde am 7. November 1909 als Sohn des Gutsbesitzers Hermann Surmann in Villendorf bei Bielefeld geboren. Nach zweijährigem Besuch der Volks- und Mittelschule kam ich 1921 zum Realgymnasium in Bielefeld, wo ich Ostern 1930 das Zeugnis der Reife erhielt. Ich wandte mich dann dem Studium der Medizin zu. Während der vorklinischen Semester besuchte ich die Universitäten Halle und Bonn, wofür ich im November 1932 die ärztliche Vorprüfung bestand. In den klinischen Semestern studierte ich in Bonn mit Ausnahme des achten, das ich in Halle absolvierte. Im November 1935 bestand ich das ärztliche Staatsexamen. Vom 15. Dezember 1935 bis Ende Juli 1936 war ich als Praktikant auf der Inneren Abteilung des Städtischen Krankenhauses Bielefeld tätig, vom 1. August bis Anfang Oktober auf der Gynäkologischen Station der Universitäts-Frauenklinik Bonn. In den letzten drei Monaten des praktischen Jahres arbeitete ich bis zu meiner Approbation in der Ambulanz der Medizinischen Klinik.
